



## 1. ULTRASSONOGRAFIA

## 2. EXAMES OFERECIDOS

O setor de ultrassonografia da clínica Digest - Diagnósticos do Aparelho Digestório, oferece os seguintes exames:

- Abdome Inferior Feminino (pélvico) e masculino (próstata)
- Abdome Superior (Vias biliares) e Abdome Total
- Aparelho urinário feminino e aparelho urinário masculino
- Cervical
- Doppler colorido de órgãos ou estruturas isoladas
- Doppler gemelar
- Doppler de mama
- Doppler de tireóide
- Doppler transvaginal
- Glândulas salivares
- Mamas
- Obstétrica
- Obstétrica de 1º trimestre (endovaginal)
- Obstétrica com Translucência Nucal
- Obstétrica com Doppler
- Obstétrica gemelar com doppler colorido
- Obstétrica gemelar cada feto
- Obstétrica Morfológica
- Obstétrica Morfológica gemelar
- Obstétrica perfil biosifico fetal
- Órgãos superficiais
- Parede Abdominal
- Próstata transretal
- Próstata via abdominal
- Retroperitônio
- Tireoide
- Transvaginal



- Transvaginal para controle de ovulação

## 6. PREPAROS PARA ADULTOS

Para facilitar a visualização e a correta execução da ultrassonografia, faz-se necessário o preparo adequado do paciente, objetivando os melhores resultados que o exame pode oferecer. Assim, deve-se obedecer ao preparo de cada exame:



Para pacientes que não tenha exame com sedação agendado no mesmo dia.

- Abdome total: Jejum absoluto de 8 horas. Tomar 6 copos de água (1) uma hora antes do exame (necessário bexiga cheia).
- Abdome Superior: Jejum absoluto de 8 horas.
- Hipocôndrio Direito: Jejum absoluto de 8 horas.
- Rins e vias urinárias (Aparelho urinário): Tomar 6 copos de água (1) uma hora antes do exame, pois é necessário estar com a bexiga cheia.
- Pélvico (Abdome inferior feminino): Tomar 6 copos de água (1) uma hora antes do exame, pois é necessário estar com a bexiga cheia.
- Próstata Transabdominal (Abdome inferior masculino): Tomar 6 copos de água (1) uma hora antes do exame (necessário bexiga cheia).
- Próstata Transretal: Tomar 6 copos de água (1) uma hora antes do exame (necessário bexiga cheia).
- Transvaginal: Não há necessidade de preparo para esse exame.
- Doppler Transvaginal: Não há necessidade de preparo para esse exame.
- Controle de Ovulação: Marcar o primeiro exame no 8º ou 9º dia do ciclo. Deve-se contar como o primeiro dia que desceu a menstruação.
- Parede Abdominal: Não há necessidade de preparo para esse exame.
- Prova motora: Trazer (1) uma caixinha de creme de leite integral.



## 7. PREPAROS PARA CRIANÇAS

Para facilitar a visualização e a correta execução da ultrassonografia, faz-se necessário o preparo adequado do paciente, objetivando os melhores resultados que o exame pode oferecer. Assim, deve-se obedecer ao preparo de cada exame:



Para crianças de 2 anos até 7 anos.

- Abdome total: Jejum absoluto de 8 horas. Tomar 3 copos de água (1) uma hora antes do exame, pois é necessário estar com a bexiga cheia.
- Abdome Superior: Jejum absoluto de 8 horas.
- Hipocôndrio Direito: Jejum absoluto de 8 horas.
- Rins e vias urinárias (Aparelho urinário): Tomar 3 copos de água (1) uma hora antes do exame, pois é necessário estar com a bexiga cheia.
- Pélvico (Abdome inferior feminino): Tomar 3 copos de água (1) uma hora antes do exame, pois é necessário estar com a bexiga cheia.



Para crianças de 1 ano a 2 anos

- Abdome total: Jejum de 8 horas e tomar 2 copos de água (1) uma hora antes do exame, pois é necessário estar com a bexiga cheia.
- Abdome Superior: Jejum absoluto de 8 horas.
- Hipocôndrio Direito: Jejum absoluto de 8 horas.
- Rins e vias urinárias (Aparelho urinário): Tomar 2 copos de água (1) uma hora antes do exame, pois é necessário estar com a bexiga cheia.
- Pélvico (Abdome inferior feminino): Tomar 2 copos de água (1) uma hora antes do exame, pois é necessário estar com a bexiga cheia.



Para crianças menores de 1 ano

- Entrar em contato conosco.